

**CERCOBIN\*-M**  
 POLVO HUMECTABLE  
 Fungicida sistémico  
 LIGERAMENTE TOXICO  
**BASF MEXICANA, S.A. de C.V.**

- [COMPOSICION PORCENTUAL](#)
- [PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO](#)
- [INSTRUCCIONES DE USO](#)
- [METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO](#)
- [APLICACIÓN](#)
- [COMPATIBILIDAD](#)
- [FITOTOXICIDAD](#)
- [PRIMEROS AUXILIOS](#)
- [RECOMENDACIONES AL MEDICO](#)
- [MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE](#)
- [CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE](#)
- [GARANTIA](#)

**COMPOSICION PORCENTUAL:**  
**Porcentaje en peso**

*Ingrediente activo:*  
 Tiofanato metílico: Dimetil-4,4-0-fenilenbis (3-tioalofanato):  
 No menos de ..... 70.00  
 (equivalente a 700 g de i.a./kg)  
*Ingredientes inertes:*  
 Humectantes, dispersantes, impurezas y compuestos relacionados:  
 No más de ..... 30.00  
 Total ..... 100.00

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- Lea cuidadosamente las instrucciones.
- Use el equipo de protección adecuado, completo.
- Llene los recipientes de los equipos de aplicaciones siempre a favor del viento, evitando derrames.
- No coma, beba o fume durante las aplicaciones.
- Después de sus labores, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

**INSTRUCCIONES DE USO (siempre calibre el equipo de aplicación):**

- CERCOBIN\*-M no causa daños ni en los cultivos, ni en el follaje, ni en los frutos.
- CERCOBIN\*-M impide el desarrollo de la enfermedad ya existente.
- CERCOBIN\*-M aplicado sobre el follaje no es lavado por la lluvia ni destruido por la acción del sol, debido a su acción sistémica.
- CERCOBIN\*-M permite la reducción del número de tratamientos debido a su largo efecto residual.

Usese exclusivamente en los cultivos y plagas aquí recomendados		
Cultivo y plaga	Dosis (kg/ha)	Observaciones
Manzano ( <i>Monilinia spp.</i> ) Durazno ( <i>Sclerotinia spp.</i> ) Nectarinos ( <i>Botrytis spp.</i> ) Ciruelos ( <i>Gloeosporium spp.</i> ) Chabacanos ( <i>Venturia spp.</i> )	60 a 100 g/ 100 lt. de agua	Aplicar desde botón rosado en adelante
Plátano ( <i>Mycosphaerella musicola</i> )	0.3 a 0.4	Aplicarlo con aceite agrícola y adyuvante

Cebolla ( <i>Botrytis spp.</i> )	0.7 a 1.0	Carencia 1 día
Fresa ( <i>Botrytis spp.</i> y <i>Sphaerostheia spp.</i> )	0.7 a 1.0	Aplicar al comienzo, mediados y final de floración
Apio ( <i>Septoria apii</i> y <i>Cercospora apii</i> )	0.7 a 1.0	Aplicar cada 10 a 14 días, carencia 7 días
Melón ( <i>Fusarium oxysporum</i> ) Sandía ( <i>Sclerotinia spp.</i> ) Pepino ( <i>Colletotrichum spp.</i> )	0.7 a 1.0	Tratamientos preventivos cada 20 a 28 días, o bien con primeros síntomas
Trigo ( <i>Erysiphae graminis</i> y <i>Septoria nodorum</i> )	0.5 a 1.0	Aplicar con primeros síntomas o después de espigamiento
Frijol ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> y <i>Ascochyta phaseolorum</i> )	0.7 a 1.0	Aplicar con primeros síntomas
Papa ( <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> y <i>Verticilium spp.</i> )	0.5 a 0.75	Aplicación bandeada al surco abierto con 400 a 500 lt./ha

#### METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

- ○ Preparación de la mezcla: Mezclar la cantidad necesaria de CERCOBIN\*-M en un poco de agua hasta formar una pasta. Vaciar la pasta en el tanque, lleno a sus 3/4 partes de agua, agitando fuertemente. Completar el volumen de agua.  
En tratamiento de poscosecha (banano, durazno) aplicar justo antes de iniciar la cosecha o sumergir la fruta en una solución al 0.05% de CERCOBIN\*-M antes de empacarla.
- ○ Aplicación aérea: Agregar al agua el emulsificante y/o aceite y mezclar. Añadir CERCOBIN\*-M y mezclar bien durante 5 min. Añadir agua y concluir la mezcla.

**APLICACION:** Se puede asperjar CERCOBIN\*-M con equipo común, terrestre o aéreo.

El volumen de agua (lt./ha) depende del tipo y tamaño del cultivo, así como del equipo a usarse. Los tratamientos se realizan de preferencia en ausencia de vientos, en horas tempranas, del día o durante el atardecer. Antes de realizar la aplicación, debe observarse que la superficie de las hojas estén secas.

Hojas con rocío o lluvia no garantizan la adherencia del caldo fungicida.

Recomendamos mantener constante la dosis. Sin embargo, se pueden variar los intervalos de tratamientos según el ataque.

**COMPATIBILIDAD:** CERCOBIN\*-M es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común, a excepción de aquéllos con reacción fuertemente alcalina. Para mayor penetración foliar se puede agregar un adherente-dispersante como adyuvante. El uso de nutrientes vegetales es recomendado.

**FITOTOXICIDAD:** CERCOBIN\*-M es muy bien tolerado por los cultivos. Las dosis aquí recomendadas son bien toleradas sin mostrarse síntomas; incluso los tratamientos efectuados en intervalos cortos, los cuales posiblemente conducen a acumulaciones de materia activa, no causan daño al cultivo.

**En caso de intoxicación, lleve al paciente  
con el médico y muéstrela la etiqueta**

#### PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica o llame a los teléfonos de emergencia para asistencia médica las 24 horas:

LADA sin costo:

01-800-009-2800

Servicio de información toxicológica de la AMIFAC:

(01) 5598-6659 ó 5611-2634

Mientras tanto, haga lo siguiente:

- ○ Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto.

- ○ Consiga atención médica inmediata.
- ○ Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- ○ Si hay salpicaduras en los ojos, lávese por lo menos durante 10 min con agua.
- ○ Si se derramó sobre la piel, lávese cuidadosamente con agua y jabón, y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada.
- ○ Si se ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente introduciendo un dedo en la garganta.
- ○ Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito ni trate de introducir nada en la boca.

#### **RECOMENDACIONES AL MEDICO:**

Tratamiento sintomático.

#### **MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:**

- ○ No reutilice el envase, destrúyase.
- ○ Empleándolo en la forma adecuada, el CERCOBIN\*-M es ligeramente tóxico para el hombre y para los animales de sangre caliente.
- ○ Evítese inhalar la niebla de aspersión y que el producto entre prolongadamente en contacto con la piel.
- ○ Protéjase los ojos.
- ○ CERCOBIN\*-M no es tóxico a las abejas.
- ○ CERCOBIN\*-M es ligeramente tóxico a las aves, es tóxico para los peces.
- ○ No contamine el agua de arroyos, lagunas, presas, etc., lavando o vertiendo plaguicidas en ellas.

#### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

- ○ Almacenarse bajo llave.
- ○ Descontamine el equipo de aplicación, lavándolo con detergente y con una solución alcalina como lejía.

**GARANTIA:** Sin perjuicio a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, BASF Mexicana, S.A. de C.V. garantiza que el producto, en su envase original sellado, cumple con las especificaciones anotadas en esta etiqueta. Sin embargo, como el almacenamiento, uso y transporte quedan fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y almacenamiento. No otorgamos ninguna otra garantía expresa o implícita.

BASF MEXICANA, S.A. de C.V.  
Av. Insurgentes Sur No. 975  
Colonia Cd. de los Deportes  
03710 México, D.F.  
\* Marca registrada  
Reg. RSCO-FUNG-0369-301-002-070