

## **Rugby® 200 sc**

Cadusafos

Nematicida agrícola

Suspensión concentrada

Producto registrado

### COMPOSICION PORCENTUAL:

Porcentaje

en peso

### **Ingrediente activo:**

Cadusafos: 0-etil S,S-di-sec- butil fosforoditioato

No menos de: 20.60%

(Equivalente a 208 g de I.A./L)

### **Ingredientes inertes:**

Agente portador, solvente, emulsificante, antiespumante,  
anticongelante, acidificador, cubierta protectora y colorante

No más de: 79.40%

Total: 100.00%

**PRECAUCION:** RUGBY® 200 SC es un nematicida moderadamente tóxico por lo cual recomendamos el cumplimiento de las precauciones durante el uso y manejo de este producto.

Evite el contacto con la piel y ojos.

Evite la inhalación del producto.

No coma ni fume durante el uso del producto.

Evite ingerir el producto.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No almacenar en casas habitación.

No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años.

No se reutilice el envase, destrúyase.

#### MODERADAMENTE TOXICO

#### INSTRUCCIONES DE USO:

##### **Siempre calibre el equipo de aplicación**

RUGBY® 200 SC es un insecticida nematicida organofosforado que actúa por contacto e ingestión.

No es absorbido por la planta, por lo que RUGBY® 200 SC tiene efecto solamente contra las plagas de la raíz.

#### USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI RECOMENDADOS

Cultivo	Plaga	Dosis
Plátano (60)	Nemátodo Barrenador de la raíz ( <i>Radopholus similis</i> )	20 cc/planta
Papa (50)	Nemátodo agallador ( <i>Meloidogyne incognita</i> ) Nemátodo de la lesión ( <i>Pratylenchus sp</i> ) Nemátodo del tallo y bulbo ( <i>Ditylenchus sp</i> )	20 L/ha

**Tiempo de reentrada:** Después de 24 horas.

( ) Intervalo de seguridad en días.

#### METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

**Papa:** Abra el envase y vacíe el producto directamente al equipo en la cantidad de agua necesaria. Aplique cuando el suelo tenga buenas condiciones de humedad para la labranza y siembra del cultivo

**Plátano:** La aplicación debe efectuarse en un semi-círculo alrededor del hijo en una banda de 40 a 50 cm. Efectuar una o dos aplicaciones por año de acuerdo al historial nematológico de la plantación.

**CONTRAINDICACIONES:** No aplique RUGBY® 200 SC cuando el suelo se encuentre seco.

**FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico a las dosis y cultivos aquí autorizados.

**INCOMPATIBILIDAD:** No se recomienda aplicar este producto junto con otros plaguicidas ni productos de naturaleza alcalina.

**¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Durante el uso y manejo utilice ropa de protección adecuada, lentes de seguridad, mascarilla, gorra, overol de mangas largas e impermeables y botas. No fume, tome o ingiera alimentos durante la manipulación de este producto. Durante la aplicación, hágala a favor de la dirección del viento, evitando la caída del producto.

Al terminar su jornada diaria, báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia.

Lave con agua y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua y jabón.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Solicite atención médica mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada.
  2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
- **Si el producto fue ingerido:** No induzca al vómito.
  - **Si la persona está consciente,** lave la boca con agua en abundancia. No administre leche o sustancias que contengan grasa. Administre carbón activado suspendido a dosis de 1 g/kg de peso. Administre un catártico (sulfato de sodio o magnesio) a dosis de 1 g/kg de peso.
  - **Si la persona está inconsciente** no le haga vomitar ni administre nada por la boca.
  - **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada.
  - **Si se adsorbió por piel:** Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambiarlo de ropa mantenerlo en reposo y abrigado.
  - **Si el producto cayó en los ojos:** Lavar por 15 minutos con abundante agua corriente levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
  - **Si hay una herida contaminada:** Lave con abundante agua y jabón.
3. Si la respiración o el corazón fallan, dar un masaje cardiaco y respiración boca a boca o boca-nariz mientras el médico llega.

EN CASO DE INTOXICACION,  
LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO  
Y MUESTRELE LA ETIQUETA

**RECOMENDACIONES AL MEDICO:** RUGBY® 200 SC pertenece al grupo químico de los organofosforados. Los organofosforados son inhibidores irreversibles de la colinesterasa.

**Signos y síntomas de intoxicación:** RUGBY® 200 SC puede causar reacciones alérgicas a personas sensibles, en algunos casos se puede presentar dolor de cabeza, mareo, debilidad, exceso de saliva, sudor, moco bronquial, contracciones musculares, temblores, náuseas, dolores abdominales, pupila puntiforme, visión borrosa y dificultad para respirar. La pérdida del conocimiento, defecación, micción involuntaria y convulsiones indican envenenamiento muy severo.

**Antídoto y tratamiento:** Suministrar sulfato de atropina de 2 a 4 mg por vía intravenosa o el equivalente a pastillas por vía oral hasta completa atropinización. También pueden usar PAM lentamente vía intravenosa 1 g para los adultos y 0.25 para los niños. Para completar la acción de la atropina. No administrar atropina a personas cianóticas.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01-800-00-928-00; 01 (55) 5598-6659 y 5611-2634 servicio las 24 horas, los 365 días al año.

**MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:** Proteja la vida silvestre, este producto es tóxico a peces, crustáceos aves y animales. Durante el manejo del producto, no contamine el aire, suelo, ríos lagos, presas o depósitos de agua, en caso de derrames (usar equipo de protección personal) recupere el material absorbiéndolo con arcilla o arena, recolecte los desechos en un recipiente hermético y envíelos a un sitio autorizado para su disposición final. Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Guárdese bajo llave, a la sombra, en lugar fresco y ventilado. No almacenar en casa habitación.

**GARANTIA:** FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de este producto por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

FMC Agroquímica de Mexico, S. de R. L. de C.V.

Av. Vallarta Núm. 6503 Local A 1-6 - Col. Cd. Granja - 45010 Zapopan, Jal.

Tel. conmutador: (33) 3003-4500 - Fax: (33) 3003-4501

