

EXCALIBUR

Concentrado emulsionable

INGREDIENTE ACTIVO:

Abamectina

REGISTRO:

RSCO-INAC-0174-X0019-009-1.87

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Mezcla de Avermectina B1a y Avermectina

B1b(conteniendo no menos de 80%

de Avermectina B1a y no más de 20% de Avermectina B1b)

(Equivalente a 18 g de i.a./L a 20 °C)

Ingredientes Inertes:

Surfactante, emulsificante, antioxidante, solvente,
impurezas y compuestos relacionados.



PARA EL CONTROL DE:

Araña roja, Araña roja, Araña roja del aguacatero, Araña roja, Minador de la hoja, Minador serpentina del chile, Araña de dos manchas, Minador serpentina del chile, Araña de dos manchas, Minador serpentina del chile, Minador de la hoja, Minador de la hoja, Minador de la hoja, Araña roja, Araña ciclamina, Minador serpentina del chile, Minador de la hoja, Araña de dos manchas, Araña ciclamina, Araña roja, Minador serpentina del chile, Araña roja, Minador de la hoja, Piojillo de la papa, Ácaro blanco, Minador de la hoja, Ácaro blanco, Araña de dos manchas, Minador de la hoja, Araña de dos manchas, Araña roja, Araña ciclamina, Minador de la hoja, Minador de la hoja, Araña de dos manchas, Piojillo de la papa, Araña roja, Minador de la hoja, Acaro blanco, Minador serpentina del Chile, Araña roja de los Cítricos, Arador o negrilla de la naranja, Arador o negrilla de la naranja, Araña roja de los cítricos, Arador o negrilla de la naranja, Araña de dos manchas, Minador de la hoja, Minador serpentina del chile, Arador o negrilla de la naranja, Araña roja de los cítricos, Araña roja, Minador de la hoja, Minador de la hoja, Minador serpentina del chile, Piojillo de la papa, Minador de la hoja, Minador serpentina del Chile, Araña de dos manchas, Araña roja europea, Araña roja, Araña de dos manchas, Araña ciclamina, Minador de la hoja, Minador serpentina del chile, Minador de la hoja, Araña de dos Manchas, Minador serpentina del Chile, Arador o negrilla de la naranja.

PRINCIPALES CULTIVOS:

T oronjo2, Tomate de cáscara2, Sandía2, Rosal2, Rosal2, Rosal2, Papa2, Naranja3, Melón2, Manzano2, Mandarin3, Limonero3, Lima3, Limonero3, Mandarin3, Manzano2, Melón2, Naranja3, Papa2, Papa2, Peral2, Peral2, Sandía2, Tomate de cáscara2, Apio, Algodon, Berenjena, Calabaza, Calabacita, Clavel, Crisantemo, Chile, Chile bell, Fresa, Gerbera, Jitomate, Lima, Limonero, Mandarin, Manzano, Melón, Naranja, Papa, Pepino, Peral, Rosal, sandía, Tomate de cáscara, Toronjo.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/HA)	INTERVALO DE SEGURIDAD (DÍAS)*
Apio1	Araña roja (Tetranychus cinnabarinus)	1.25	7
Aguacate2	Araña roja (Oligonychus perseae)	50-150 ml/100 L de agua	14
	Araña roja del aguacatero (Oligonychus punicae)	0.50 – 1.0	
Algodón2	Araña roja (Tetranychus cinnabarinus) Minador de la hoja (Liriomyza sp.)	0.50-1.2	20
Berenjena2	Minador serpentina del chile (Liriomyza munda) Araña de dos manchas (Tetranychus urticae)	0.50-1.25	3
Calabaza2	Minador de la hoja (Liriomyza sativae),	0.50-1.0	7
Calabacita2	Minador serpentina del chile (Liriomyza munda)	0.50-1.25	0.50-1.0
	Minador de la hoja (Liriomyza sativae) Minador de la hoja (Liriomyza sp)	0.50-1.0	

DE VENTA EN:



Innovación Agrícola

innovacionagricola.com
01 800 248 8800



Clavel2	Minador de la hoja (Liriomyza sp) Araña roja (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae) Araña ciclamina (Steneotarsonemus pallidus)	25-50 ml/10 L de Agua	SL
Crisantemo2	Minador serpentina del chile (Liriomyza munda)	500-1000 ml/ha	SL
	Minador de la hoja (Liriomyza huidobrensis)	100 ml/100 L de agua	
	Araña de dos manchas (Tetranychus urticae) Araña ciclamina (Steneotarsonemus pallidus) Araña roja (Tetranychus cinnabarinus)	25-50 ml/10 L de agua	
Chile2	Minador serpentina del chile (Liriomyza munda)	0.50-1.25	3
	Araña roja (Tetranychus urticae) Minador de la hoja (Liriomyza trifolii, Liriomyza sp.)	0.50-1.0	
	Piojillo de la papa (Bactericera cockerelli) Ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus)	0.75-1.0	
Chile Bell2	Minador de la hoja (Liriomyza sp.) Ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus)	0.30-1.0	3
Fresa2	Araña de dos manchas (Tetranychus urticae)	0.50-1.25	14
Gerbera2	Minador de la hoja (Liriomyza sp.) Araña de dos manchas (Tetranychus urticae) Araña roja (Tetranychus cinnabarinus) Araña ciclamina (Steneotarsonemus pallidus)	25-50 ml/10 L de agua	SL
Jitomate2	Minador de la hoja (Liriomyza sativae, Liriomyza trifolii) Gusano alfiler del tomate (Keyferia lycopersicella) Araña de dos manchas (Tetranychus urticae)	0.50-1.0	10
	Piojillo de la papa (Bactericera cockerelli)	0.50-0.75	
	Araña roja (Tetranychus cinnabarinus)	0.30-1.2	
	Minador de la hoja (Liriomyza sp) Acaro blanco (Polyphagotarsonemus latus)	0.30-1.0	
Lima3	Minador serpentina del Chile (Liriomyza munda)	1.0-1.5	7
	Araña roja de los Cítricos (Panonychus citri) Arador o negrilla de la naranja (Phyllocoptruta oleivora)	Araña roja de los Cítricos (Panonychus citri) Arador o negrilla de la naranja (Phyllocoptruta oleivora)	
Limonero3	Arador o negrilla de la naranja (Phyllocoptruta oleivora)	0.50-1.5	7
Mandarino3	Araña roja de los cítricos (Panonychus citri) Arador o negrilla de la naranja (Phyllocoptruta oleivora)	0.50-1.5	7

Manzano²	Araña de dos manchas (Tetranychus urticae)	0.50-1.0	28
Melón²	Minador serpentina del chile (Liriomyza munda)	0.50-1.0	7
	Minador serpentina del chile (Liriomyza munda)	0.50-1.25	
Naranja³	Arador o negrilla de la naranja (Phyllocoptruta oleivora)	0.50-1.5	7
	Araña roja de los cítricos (Panonychus citri)		
Papa²	Araña roja (Tetranychus urticae) Minador de la hoja (Liriomyza trifolii)	0.50-1.0	3
	Minador de la hoja (Liriomyza sp.)	0.30-1.0	
	Minador serpentina del chile (Liriomyza munda)	0.50-1.25	
	Piojillo de la papa (Bactericera cockerellii)	0.50-1.25	
Pepino²	Minador de la hoja (Liriomyza sp.)	0.45-0.60	7
	Minador serpentina del Chile (Liriomyza munda)	0.50-1.25	
Peral²	Araña de dos manchas (Tetranychus urticae)	0.50-1.0	28
	Araña roja europea (Panonychus ulmi)	0.75-1.0	
Rosal²	Araña roja (Tetranychus cinnabarinus)	25-50 ml/10 L de agua	SL
	Araña de dos manchas (Tetranychus urticae) Araña ciclamina (Steneotarsonemus pallidus)		
	Minador de la hoja (Liriomyza sp)		
Sandía²	Minador serpentina del chile (Liriomyza munda)	0.50-1.25	3
	Minador de la hoja (Liriomyza sp)	0.50-1.0	
Tomate de cáscara²	Araña de dos Manchas (Tetranychus urticae) Minador serpentina del Chile (Liriomyza munda)	0.50-1.25	3
Toronjo²	Arador o negrilla de la naranja (Phyllocoptruta oleivora)	0.50-1.5	7

OBSERVACIONES:

* () : Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha y SL= Sin Límite.

1 Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 400-500 L de agua /ha.

2 Realizar las aplicaciones dirigidas al follaje.

3 Realizar las aplicaciones dirigidas al follaje con un volumen de 1000 L de agua/ha

LMRs

CULTIVO	LMR (ppm)	FUENTE
Apio	0.10	EPA
Aguacate	0.020	EPA
Algodón	1.0	EPA
Berenjena	0.020	EPA
Calabacita	0.005	EPA
Clavel	N/A	
Crisantemo	N/A	
Chile	0.020	EPA
Fresa	0.05	EPA
Gerbera	N/A	
Jitomate	0.020	EPA

DE VENTA EN:


Innovación Agrícola
innovacionagricola.com
01 800 248 8800


Lima	0.10	EPA
Limonero	0.10	EPA
Mandarino	0.10	EPA
Manzano	0.020	EPA
Melón	0.005	EPA
Naranja	0.10	EPA
Papa	0.01	0.01
Pepino	0.005	EPA
Peral	0.02	EPA
Rosal	N/A	
Sandía	0.002	EPA
Tomate de cáscara	0.020	EPA
Toronjo	0.10	EPA

