



FICHA TÉCNICA

MILITAR PLUS®

BIOPLAGUICIDA CON ACCIÓN INSECTICIDA
(MOSCA BLANCA)

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-MEZC-INAC-1106R-X0009-375-050
REGISTRO OMRI: (Bioplaguicida) / ida - 7328



Es un producto bioplaguicida formulado a base de *Daphne gnidium* (torvisco), *Ruta chalepensis* (ruda) y *Pipiper aurantium* (Mentha limón), con acción específica, insecticida y larvicida, frente a Mosquita blanca (*Bemisia tabaci* y *Trialeurodes vaporariorum*).



RIQUEZAS GARANTIZADAS

<i>Daphne gnidium</i>	20 %
<i>Ruta chalepensis</i>	20 %
<i>Pipiper aurantium</i>	10 %
Ingredientes inertes	50 %

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

pH	4.75 +/- 0.5
Aspecto	Líquido
Color	Naranja
Densidad	1.02 +/- 0.5 g/cm ³
Solubilidad	Completamente soluble en agua
Inflamabilidad	No presenta punto de inflamabilidad

USOS AUTORIZADOS

- Para uso foliar en todo tipo de cultivos.
- Insecticida específico para Mosquita blanca.
- Efecto ninfa y adulticida contra mosca blanca.
- Síntomas que presenta insectos intoxicados: descargas eléctricas repetidas, movimientos incoherentes, convulsiones, parálisis, muerte.
- Actúa por contacto e ingestión.
- Inhibe el proceso de cambio de instar de estadios juveniles a estadios adultos.
- Degrada la quitina del exoesqueleto del cuerpo de los individuos fitopatógenos.
- Efecto de enmascaramiento de feromonas.
- Su efecto se potencializa en la mezcla con FOS SOAP.
- Buena sinergia con otros tipos productos insecticidas de diferente naturaleza.
- Nivel de toxicidad 1 con la fauna auxiliar.





FICHA TÉCNICA

DOSIS DE APLICACIÓN

CULTIVOS	INTERVALO DE SEGURIDAD	PLAGAS	DOSIS (ML/DE AGUA)	OBSERVACIONES
Fresa, arándano, zarzamora, grosella, frambuesa.	Sin límite	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	4.0 - 8.0	Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando sobre el cultivo se detecte la presencia de los primeros individuos.
Jitomate, papa, tomate de cáscara, berenjena, chile, chile bell.	Sin límite	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	4.0 - 8.0	Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando sobre el cultivo se detecte la presencia de los primeros individuos.
Pepino, calabaza, calabacita, melón, sandía, chayote.	Sin límite	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	6.0	Realizar una aplicación al follaje. Iniciar las aplicaciones cuando sobre el cultivo se detecte la presencia de los primeros individuos.
Manzano, durazno, peral, membrillo, albaricoque, ciruelo, cerezo, almendro.	Sin límite	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	4.0 - 8.0	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando sobre el cultivo se detecte la presencia de los primeros individuos.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Botellas de 1 L (cajas 12 x 1L), Garrafa de 5 L (cajas 4 x 5 L), Garrafa de 20 L, Bidones de 200 L, Contenedores de 1000 L.

