

GENCROP

BACTERICIDA AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	% EN PESO
Sulfato de gentamicina (Equivalente a 20 g de IA/kg)	2%
Clorhidrato de oxitetraciclina (Equivalente a 60 g de IA/kg)	6%
Ingrediente inerte: dispersante	92%

Bactericida agrícola a base de sulfato de gentamicina, antibiótico aminoglucósido de amplio espectro, y clorhidrato de oxitetraciclina, antibiótico de amplio espectro del grupo de las tetraciclinas; sustancias capaces de inhibir los procesos vitales de las bacterias, impidiendo su desarrollo y reproducción. **GENCROP®** ingresa en la célula bacteriana por un mecanismo de transporte activo en dos etapas. En la primera etapa, el ingreso a la célula depende del metabolismo aerobio y su potencial transmembrana. La segunda fase, de ingreso acelerado, se ve favorecida por la unión del aminoglucósido al ribosoma bacteriano. Una vez dentro de la célula, **GENCROP®** interfiere en la síntesis de proteínas, generando proteínas anómalas y disfuncionales que provocan la muerte de las bacterias.

Registro sanitario: **RSCO-MEZC-1323-0002-002-008**

Características del producto

Estado físico: Sólido polvo humectable.


pH: 3.5 a 4.5.

Color: Ligeramente amarillo.

Olor: Característico.

Solubilidad: Dispersable en agua.

Presentación: 500 g.




DE VENTA EN:
Innovación Agrícola®

innovacionagricola.com
(667) 758 88 28 | [f](#) [i](#) [in](#)

GENCROP

BACTERICIDA AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	% EN PESO
Sulfato de gentamicina (Equivalente a 20 g de IA/kg)	2%
Clorhidrato de oxitetraciclina (Equivalente a 60 g de IA/kg)	6%
Ingrediente inerte: dispersante	92%



Recomendaciones de uso

CULTIVO	DOSIS	ENFERMEDAD	OBSERVACIONES
Berenjena, chile, chile bell, jitomate, tomate de cáscara, papa (SL)	500 - 1000 g/ha	Mancha bacte- riana (Xanthomonas vesicatoria)	Realizar tres aspersiones foliares a intervalos de 10 días. Volumen de aplicación de 300 - 400 L/ha.
Pepino, melón, sandía, calabaza, calabacita, cha- yote (SL)	1.25 - 3.75 g/L de agua	Mancha angu- lar (Pseudomo- nas syringae)	Realizar dos aplicaciones de follaje a intervalos de 7 días cuando se detecten los prim- eros síntomas de la enferme- dad. Volumen de aplicación de 350 a 450 L/ha.
Cebolla, ajo, poro, cebollín (SL)	1.25 - 3.75 g/L de agua	Tizón de fuego (Erwinia amylo- vora)	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se detecten los prim- eros síntomas de la enferme- dad. Volumen de aplicación 350 a 450 L/ha
Manzano, membrillo, peral, tejocote (SL)	1 - 2 g/L de aguavv	Pudrición del bulbo (Pseudo- monas viridi- flava)	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se detecten los prim- eros síntomas de la enferme- dad. Volumen de aplicación de 950 a 1050 L/ha.

(): Intervalo de seguridad. Días que deben trans-
currir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite.

El tiempo de reentrada a la zona tratada es una
vez que seque el producto.



DE VENTA EN:
Innovación Agrícola®

innovacionagricola.com
(667) 758 88 28 | f @ J in