

KILL-MINA 6®

Solución concentrada acuosa

INGREDIENTE ACTIVO: 2,4-D: Sal dimetilamina del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético con un contenido de ácido 2,4-D, no menor de 83%
REGISTRO:

RSCO-HEDE-0222-322-014-067

RIQUEZAS GARANTIZADAS
2,4-D: Sal dimetilamina de ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (con un contenido de ácido 2,4-D no menor de 83%) (Equivalente a 720 g de i.a./L a 20 °C.)
Ingredientes Inertes - 59.00 %
INGREDIENTES INERTES:

Diluyente (agua).

PARA EL CONTROL DE:

Herbicida selectivo que se emplea para el control de malezas de hoja ancha en los cultivos que a continuación se indican.

PRINCIPALES CULTIVOS:

Correhuela anual, Girasol, Verdolaga, Diente de león, Bledo, Tomatillo, Malva, Acahual, Lengua de vaca, Ortiga, Moztaza, Moztaza, Cardo, Rabano silvestre, Arroz, Caña de azúcar, Cebada, Maíz, Sorgo, Trigo.



CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/HA)	INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN
Arroz (SL)*	Correhuela anual (<i>Ipomoea purpurea</i>) Diente de león (<i>Taraxacum officinale</i>) Lampotillo, Gigantón (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Rábano silvestre (<i>Rhaphanus raphanistrum</i>) Tomatillo (<i>Physalis angulatus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Malva (<i>Malva parviflora</i>)	1.0 - 2.0	Aplicar de 3 a 6 días antes de inundar, cuando el arroz haya amacollado pero antes del encañe (5 hojas)
Caña de azúcar (SL)	Correhuela anual (<i>Ipomoea purpurea</i>) Girasol (<i>Helianthus annuus</i>) Lampotillo, Gigantón (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Rábano silvestre (<i>Rhaphanus raphanistrum</i>) Tomatillo (<i>Physalis angulatus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	2.6 - 4.0	Post-emergente al cultivo ya que la caña alcance 30cm de altura
Cebada (SL)	Correhuela anual (<i>Ipomoea purpurea</i>) Girasol (<i>Helianthus annuus</i>) Lampotillo, Gigantón (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>)	0.45 - 1.25	Aplicar después del amacollamiento, pero antes del encañe (5 hojas). No debe aplicarse cuando existan cultivos susceptibles cerca del campo.
Maíz (SL)	Correhuela anual (<i>Ipomoea purpurea</i>) Bledo (<i>Amaranthus spp.</i>) Diente de león (<i>Taraxacum officinale</i>) Flor amarilla (<i>Melampodium divaricatum</i>) Lampotillo, gigantón (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Rábano silvestre (<i>Rhaphanus raphanistrum</i>) Tomatillo (<i>Physalis angulatus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Rosilla, aceitilla (<i>Bidens odorata</i>)	1.0 - 2.0	Aplicar cuando el cultivo esté en desarrollo vegetativo

Sorgo (SL)	Correhuela anual (<i>Ipomoea purpurea</i>) Diente de león (<i>Taraxacum officinale</i>) Girasol (<i>Helianthus annuus</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Malva (<i>Malva parviflora</i>) Mostaza (<i>Brassica campestris</i>) Rábano silvestre (<i>Rhaphanus raphanistrum</i>)	0.6 – 1.3	Aplicar cuando el sorgo tenga una altura entre 15-25 cm y la maleza menos de 5 cm de altura
Trigo (SL)	Correhuela anual (<i>Ipomoea purpurea</i>) Diente de león (<i>Taraxacum officinale</i>) Lampotillo, Gigantón (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Rábano silvestre (<i>Rhaphanus raphanistrum</i>)	0.45 – 1.25	Aplicar en pleno amacollo antes del encañe

PLAGA	CULTIVO	DOSIS (L/HA)	INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN
CORREHUELA ANUAL (<i>Ipomoea purpurea</i>); GIRASOL (<i>Helianthus annuus</i>); VERDOLAGA (<i>Portulaca oleracea</i>); DIENTE DE LEÓN (<i>Taraxacum officinale</i>); BLEDO (<i>Amaranthus spp.</i>);	MAÍZ	1.3 - 2.0	Aplicarse en post-emergencia dirigida cuando el maíz tenga más de 20 cm. No aplique durante la formación de la espiga o jilote. Aplicar a la hierba tierna.
	SORGO	0.6 - 1.3	Aplicar cuando la planta tenga de 3 a 5 hojas y de 10 a 20 cm de altura y la maleza 5 cm. Cuando el sorgo tenga más de 5 hojas dirigir la aplicación a la maleza.
TOMATILLO, MALVA (<i>Malva neglecta</i>); ACAHUAL (<i>Tithonia tubaeiformis</i>); LENGUA DE VACA (<i>Rumex crispus</i>); ORTIGA (<i>Urtica sp.</i>); MOSTAZA (<i>Brassica spp.</i>); CARDO (<i>Cirsium arvense</i>); RABANO SILVESTRE (<i>Raphanus raphanistrum</i>).	CAÑA DE AZÚCAR	2.6-4.0	Aplicar en post-emergencia al cultivo y postemergencia temprana a la maleza. (menos de 5 cm de altura).
	ARROZ	1.0 - 1.3	Aplicar cuando el arroz haya amacollado, pero antes del encañe.
	TRIGO CEBADA	0.3 - 1.3	Aplicar cuando las plantas estén amacollando, pero antes del encañe.

CULTIVO	LMR (mg/kg)	FUENTE
Arroz	0.5	EPA
Caña de azúcar	0.05	EPA
Cebada	2.0	EPA
Maíz	0.05	EPA
Sorgo	0.2	EPA
Trigo	2.0	EPA