

**AZUFRE 93% AGRICOLA**  
POLVO SECO  
Fungicida-acaricida  
**AGRICULTURA NACIONAL DE JALISCO, S.A. de C.V.**

- [COMPOSICION PORCENTUAL](#)
- [PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO](#)
- [INSTRUCCIONES DE USO](#)
- [RECOMENDACIONES AL MEDICO](#)

**COMPOSICION PORCENTUAL:**  
**Porcentaje en peso**

*Ingrediente activo:*  
Azufre elemental:  
No menos de ..... 93  
(equivalente a 930 g de I.A./kg)  
*Ingredientes inertes:*  
Diluyentes y compuestos relacionados:  
No más de ..... 7  
Total ..... 100  
Finura de 93% pasa por tamiz de 325 mallas

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- o o No permita que lo bañe el polvo.
- o o No contamine aguas destinadas para beber.
- o o Manténgase lejos del calor o flama abierta.
- o o Evite respirar el polvo, usando una mascarilla adecuada.
- o o Evite el contacto directo con la piel, si esto sucede lávese con agua y jabón.
- o o Evite el contacto con los ojos usando equipos de protección.
- o o Los ojos deben lavarse con agua boricada al 1%.
- o o No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.
- o o Guárdese bajo llave.
- o o Manténgase alejado de los niños y animales.
- o o No almacenar en casa-habitación.
- o o No deberán exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactancia y personas menores de 18 años.
- o o El azufre puede quemar el follaje y los frutos durante periodos de alta temperatura.
- o o No aplique azufre a manzanos y otros cultivos sensibles cuando haya temperaturas de 32°C o más.
- o o No use azufre con aplicaciones de aceite o tres semanas antes de una aplicación de aceite.
- o o Si el cultivo debe ser tratado para ser embarcado o congelado, consulte procedimientos de conservación de alimentos antes de aplicar el azufre.

**INSTRUCCIONES DE USO (siempre calibre el equipo de aplicación):**

- o o AZUFRE 93% AGRICOLA está formulado para usarse como polvo en frutales, hortalizas y plantas ornamentales cuando se necesita un azufre microfino y de propiedades altamente adhesivas. Aplique preferentemente con maquinaria terrestre de fuerte golpe de aire.
- o o No aplicar por vía aérea.
- o o **Importante:** Para mejores resultados, aplicar cuando el aire esté en calma. Espolvoree lo suficiente para mantener el follaje y los frutos cubiertos con una capa uniforme y ligera. Consulte a los representantes técnicos y a los distribuidores para información adicional, como dosis y números de aplicaciones necesarias en las diferentes localidades.

**En caso de intoxicación, lleve al paciente con el médico y muéstrela la etiqueta**

<b>Usese exclusivamente en los cultivos y plagas aquí recomendados</b>	
<b>Cultivo y plaga</b>	<b>Dosis (kg/ha)</b>
<b>Fresa:</b>	
Cenicilla polvorienta ( <i>Sphaeroteca humuli</i> )	10.0 a 15.0

<b>Vid:</b>	
Cenicilla polvorienta ( <i>Sphaeroteca humuli</i> )	12.0 a 15.0
<b>Alfalfa:</b>	
Araña roja ( <i>Tetranychus spp.</i> )	15.0 a 25.0
<b>Frijol y frijol ejotero:</b>	
Chahuistle ( <i>Uromyces phaseoli</i> )	15.0 a 30.0
Araña roja ( <i>Tetranychus spp.</i> )	
Cenicilla polvorienta ( <i>Erysiphe polygoni</i> )	
<b>Cacahuate:</b>	
Chahuistle ( <i>Puccinia arachidis</i> )	15.0 a 30.0
<b>Chícharo:</b>	
Cenicilla polvorienta ( <i>Erysiphe polygoni</i> )	15.0 a 30.0
<b>Algodonero:</b>	
Viruela ( <i>Puccinia stakmanii</i> )	25.0 a 30.0
Araña roja ( <i>Tetranychus desertorum</i> )	
<b>Durazno:</b>	
Cenicilla polvorienta ( <i>Sphaeroteca pannosa</i> )	50.0 a 60.0
<b>Naranja:</b>	
Arador o negrilla ( <i>Phyllocoptruta oleivora</i> )	50.0 a 150.0
<b>Mango:</b>	
Cenicilla polvorienta ( <i>Oidium mangiferae</i> )	50.0 a 150.0

**Nota:** El intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y el inicio de la cosecha es sin límite.

#### **RECOMENDACIONES AL MEDICO:**

*Síntomas de intoxicación:* Al contacto por periodos prolongados con la piel, causa irritación.

*Tratamiento:* Dar tratamiento sintomático.

AGRICULTURA NACIONAL DE JALISCO, S.A. de C.V.  
Metalurgia No. 1477  
Colonia Alamo Industrial  
45560 Tlaquepaque, Jal.  
Reg. RSCO-FUNG-0302-306-001-093