

FICHA TÉCNICA

SYSTEM MAX

FUNGICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE.

IA: Ácido gálico

RSCO-FUNG-0386-0558-009-8.3

OMRI Listed: (ida-4639)



SYSTEM MAX® es Biofungicida sistémico natural con acción fungicida y fungistática, formulado a base de extractos alcohólicos de *Mimosa tenuiflora* (mimosa) y *Quercus robur* (roble).

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Ácido Gálico (Extracto alcohólico de <i>Mimosa</i> + <i>Quercus</i>)	8.3 %
Diluyente	91.7 %

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

pH	5.0 ± 0.5
Aspecto	Líquido
Color	Azul oscuro
Densidad	1.36 ± 0.05 g/cm ³
Solubilidad en agua	Completamente soluble en agua
Inflamabilidad	No presenta punto de inflamabilidad

USOS AUTORIZADOS

- Bactericida y fungicida de efecto preventivo y curativo contra bacterias fitopatógenas.
- Actúa contra las bacterias rompiendo las membranas de las paredes celulares de las mismas.
- No causa fitotoxicidad, no acartona, no aventaja y no mancha.
- 100% complejoado con alta eficiencia, para uso edáfico y foliar en todo tipo de cultivos.
- Corrector de estado carenciales de microelemento Cobre (Cu) en los cultivos.
- Buena sinergia con otros tipos de cobre metal y productos de otra naturaleza.
- No detiene el desarrollo vegetativo de los cultivos.
- Una vez que la planta absorba el ion cobre, actúa de barrera interna para la entrada de agentes fitopatógenos.

Puede aplicarse en cultivos de: jitomate, tomate de cáscara, papa, tabaco, chile, chile bell, berenjena, arándano, frambuesa, fresa, grosella, zarzamora, pepino, calabaza, calabacita, melón, sandía, chayote, aguacate, mango, papaya, cidro, lima, limón, mandarina, naranja, pomelo, tangerino, toronja, manzana, membrillo, peral, tejocote, acelga, apio, lechuga, espinaca, brócoli, col, col de bruselas, coliflor, colza, colinabo, mostaza.



FICHA TÉCNICA

DOSIS DE APLICACIÓN

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS (ML/L)	OBSERVACIONES
Fresa Zarzamora Frambuesa Arándano Grosell (SL)	Moho blanco (<i>Botrytis cinérea</i>)	4.0 - 5.0	Realizar dos aplicaciones, al follaje a intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas. Volumen de aplicación 470 - 570 L de agua/Ha..
Pepino Melón Sandía Calabaza Calabacita Chayote Chilacayote (SL)	Moho blanco (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	5.0	Realizar dos aplicaciones, al follaje a intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas. Volumen de aplicación 380 L de agua/Ha.
Jitomate Chile Chile Bell Tomate de cáscara Berenjena Papa (SL)	Damping off (<i>Fusarium spp</i>)	4.0 - 5.0	Realizar dos aplicaciones, al follaje a intervalos de 6 días. Iniciar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas. Volumen de aplicación 480 - 530 L de agua/Ha..

Tiempo de reentrada a las áreas tratadas: Una vez que seque el producto

Intervalo de Seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Botellas de 1 L (cajas 12 x 1L), Garrafa de 5 L (cajas 4 x 5 L), Garrafa de 20 L, Bidones de 200 L, Contenedores de 1000 L.