

FICHA TÉCNICA

SYSTEM MAX

FUNGICIDA
EXTRACTO ALCOHÓLICO DE MIMOSA TENUIFLORA
60% + QUERCUS ROBUR 30%.

OMRI LISTED (Pest Crop) – Product number: ida-4639.
 COFEPRIS: Registro sanitario de plaguicidas No. RSCO-FUNG-0386-0558-009-8.3.



RIQUEZAS GARANTIZADAS / COMPOSICION

Extracto de Mimosa Tenuiflora	60.0 % p/p
Extracto de Quercus Robur	30.0 % p/p
Ácido gálico + Ácido pirogálico	8.30 % p/v

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido
Color	Marrón ³
pH	5.5 ± 0.5
Densidad	1.03 ± 0.05 g/cm
Solubilidad en agua	Completamente soluble al agua
Inflamabilidad	No presenta punto de inflamabilidad

DESCRIPCIÓN

- Fungicida sistémico. Acción fungicida y fungiestática contra diferentes enfermedades de suelo (Damping off) y enfermedades que causan pudriciones (*Sclerotinia sp*, *Botrytis cinerea*, ...)
- Alto contenido en taninos, flavonoides, fenoles, terpenos, saporinas, lípidos, pectina y alcanoides
- Para uso edáfico y foliar en todo tipo de cultivos
- Acción sistémica (ascendente y descendente) y contacto
- Efecto astringente y cicatrizante. Efecto bactericida
- Buenas sinergias con otros productos de diferente naturaleza
- Su aplicación puede ser por cinta de riego



ENVASADO

Botellas de 1 L (cajas 12 x 1L)

Garrafa de 5 L (cajas 4 x 5 L)

Garrafa de 20 L

Bidones de 200 L

Contenedores de 1000 L

DOSIS DE APLICACIÓN

CULTIVOS	INTERVALO DE SEGURIDAD	PLAGA	DOSIS (mL/L de agua)	OBSERVACIONES
Fresa, Zarzamora, Frambuesa, Arándano, Grosella	Sin límite	Moho blanco (<i>Botrytis cinérea</i>)	4.0 – 5.0 mL/L 1-3 L/ha	Realizar dos aplicaciones, al follaje a intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas. Volumen de aplicación 470 - 570 L de agua/ha.
Pepino, Melón, Sandía, Calabaza, Calabacita, Chayote, Chilacayote	Sin límite	Moho blanco (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	5.0 mL/L 1-3 L/ha	Realizar dos aplicaciones, al follaje a intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas. Volumen de aplicación 380 L/ha.
Jitomate, Chile, Chile Bell, Tomate de cáscara, Berenjena, Papa	Sin límite	Damping off (<i>Fusarium spp</i>)	4.0 – 5.0 mL/L 1-3 L/ha	Realizar dos aplicaciones, al follaje a intervalos de 6 días. Iniciar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas. Volumen de aplicación 480 - 530 L de agua/ha.

* Documentos disponibles