



INDELTIN

INSECTICIDA AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA %

DELTAMETRINA: (S)- α -ciano-3-fenoxibencil(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 25 g de i. a. /L. a 20 °C) 2.8

INGREDIENTES INERTES: Emulsificante, surfactantes, acidificante, antioxidante, sinergista, solvente, impurezas y compuestos relacionados. 97.20

No. de Registro Sanitario:
RSCO-INAC-0119-0691-009-2.8



INDELTIN® es un insecticida piretroide que actúa por ingestión y contacto sobre el sistema nervioso de los insectos. Se recomienda aplicarse en los cultivos y para el control de las plagas que se indican en el siguiente cuadro.

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS ML/HA	OBSERVACIONES
Limonero (Sl)* Lima (Sl) Mandarino (Sl) Naranja (Sl) Tangerina (Sl) Toronjo (Sl)	Psílido asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	500-600	Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 950 L/ha.
Algodonero (l)	Gusano rosado del algodón (<i>Pectinophora gossypiella</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Medidor de la hoja del algodón (<i>Alabama argillacea</i>), Perforador de la hoja del algodón (<i>Baculatrix thurberiella</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano de la yema o Gusano de la yema del tabaco (<i>Heliothis virescens</i>)	500	Aplicación al follaje
Soya (l)	Falso medidor de la soja (<i>Pseudoplusia includens</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>), Gusano terciopelo (<i>Anticarsia gemmatilis</i>)	400-500	Aplicación al follaje
Papa (l)	Palomilla de la papa (<i>Phthorimaea operculella</i>)	500	Aplicación al follaje
Garbanzo (l)	Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>)	400-500	Aplicación al follaje
Maíz (l)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	300	Aplicación al follaje
Tabaco (l)	Gusano de cuerno del tabaco (<i>manduca sexta</i>) Gusano de la yema (<i>Heliothis virescens</i>)	500	Aplicación al follaje
Jitomate (l)	Gusano alfiler del tomate (<i>Keiferia lycopersicella</i>) Minador serpentina (<i>Liriomyza munda</i>) Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>)	500	Aplicación al follaje
Frijol (l)	Conchuela del frijol (<i>Epilachna varivestis</i>) Gusano trozador (<i>Agrotis sp</i>) Gusano saltarín (<i>Elasmopalpus lignosellus</i>)	200-300	Aplicación al follaje

(*): Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha y SL= Sin Límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.



DE VENTA EN:

Innovación Agrícola®

innovacionagricola.com
(667) 758 88 28 | f t in



INDELTIN

INSECTICIDA AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	%
DELTAMETRINA: (S)- α -ciano-3-fenoxi-bencil(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 25 g de i. a. /L. a 20 °C)	2.8
INGREDIENTES INERTES: Emulsificante, surfactantes, acidificante, antioxidante, sinergista, solvente, impurezas y compuestos relacionados.	97.20

No. de Registro Sanitario:
RSCO-INAC-0119-0691-009-2.8



LMR (Límite máximo de residuos):

CULTIVOS	LMR (mg/kg)	FUENTE
Limonero Lima Mandarino Naranja Tangerina Toronjo	0.05	Unión Europea.
Algodonero	0.2	EPA*
Soya	0.1	EPA*
Papa	0.2	Unión Europea
Garbanzo	0.2	Unión Europea
Maíz	0.5	EPA
Tabaco	---	---
Jitomate	1.0	EPA
Frijol	0.2	Unión Europea

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Con el equipo de protección puesto, llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora. Destape el frasco con cuidado. Haga una pre-mezcla con la cantidad del producto necesario y poca agua. Agite perfectamente y agregue dicha pre-mezcla al tanque o depósito de la aspersora, complete con agua hasta su capacidad, agitando continuamente. Aplique inmediatamente, volumen de aplicación de 900 – 1000 L de agua/ha.

CONTRAINDICACIONES.

No se debe aplicar en horas de calor intenso ni cuando la velocidad del viento sea mayor de 15 km/hr.

FITOTOXICIDAD.

Este producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas bajo las anteriores Instrucciones de uso.

INCOMPATIBILIDAD.

No se recomienda INDELTIN® en mezclas de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



DE VENTA EN:

Innovación Agrícola®

innovacionagricola.com
(667) 758 88 28 | f @ in