

Salibro®

Reklemel® active

NEMATICIDA

FICHA TÉCNICA

Salibro® es un nuevo nematicida químico, formulado a base del novedoso ingrediente activo **Reklemel® active**, para el control de nematodos fitoparásitos.

Reklemel® es el primer nematicida de las sulfonamidas, un grupo químico diferente a otros nematicidas comerciales.

Salibro® brinda una excelente actividad sobre nematodos fitoparásitos, además de un perfil ambiental favorable, lo que te permitirá impulsar a tu cultivo a su máximo potencial de rendimiento mientras ayudar a cuidar la salud de tu suelo.



Salibro®

Reklemel'active

NEMATICIDA

PROTEGE DESDE LA RAÍZ EL FUTURO DE TUS CULTIVOS.

Suelos sanos, cosechas abundantes.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente Activo: Fluzaindolizine

Familia Química: Imidazopyridina

Presentaciones: 1L y 4L

Categoría Toxicológica: 5 (Banda Verde)

Registro Sanitario: RSCO-NEMA-0915-X0020-064-41.15

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente Activo: Fluzaindolizine (Equivalente a 500 g de i.a./L a 20°C)

Ingredientes Inertes: Dispersante, agente humectante, preservantes, antiespumantes, ajustador de pH, secuestrante, espesantes, anticongelante y diluyente.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	NEMÁTODO	DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIONES
Berenjena, Chile, Jitomate, Pimiento, Tomate Verde (1)*	Nemátodo Agallador (<i>Meloidogyne incognita</i>) Falso Agallador (<i>Nacobbus aberrans</i>) Nemátodo Agallador (<i>Meloidogyne enterolobii</i>)	1.5 – 2.0	Aplicación en riego por goteo: Realice 1 aplicación al menos un día antes del trasplante a través del sistema de riego por goteo; volumen de aplicación 30,000 L de agua/ha, fraccionado en 3 etapas; una previa de 6,000 L, una intermedia de 9,000 L (donde se realiza la aplicación) y un volumen final de 15,000 L
Calabaza, Calabacita, Melón, Pepino, Sandía (1)*	Nemátodo Agallador (<i>Meloidogyne incognita</i>)	1.0 – 1.5	Aplicación en riego por goteo: Realice 1 aplicación al menos un día antes del trasplante a través del sistema de riego por goteo; volumen de aplicación 30,000 L de agua/ha, fraccionado en 3 etapas; una previa de 6,000 L, una intermedia de 9,000 L (donde se realiza la aplicación) y un volumen final de 15,000 L
Papa (21)*	Nemátodo Agallador (<i>Meloidogyne incognita</i>)	1.5 – 2.0	Aplicación al fondo del surco al momento de la siembra: Realice 1 aplicación al momento de la siembra dirigida al fondo del surco; volumen de aplicación 350-450 L/ha.
	Nemátodo dorado (<i>Globodera rostochiensis</i>)	2.0	

*(1) Intervalo de Seguridad = Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **Número máximo de aplicaciones por temporada de cultivo:** Realice un máximo de dos aplicaciones por temporada de cultivo, según la presión de la plaga. **Número máximo de aplicaciones por año:** No hacer más de cuatro aplicaciones al año.

Tiempo de re-entrada a las zonas tratadas: No entre ni permita que otras personas entren al área aplicada sin el equipo de protección adecuado en un lapso de 12 hrs, después de la aplicación. Ver equipo de protección en la sección "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO".

Debido a que los valores de Límite Máximo de Residuos (LMR) pudieran cambiar con el tiempo, se recomienda al usuario consultar las fuentes de referencia oficiales: USA-EPA (<https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C>) y COFEPRIS (<http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/ConsultasConWebRegPlaguicida.asp>). Para el caso de exportación queda bajo su responsabilidad el cumplimiento con los LMRs de los países destino.

CONTRAINDICACIONES

El Nematicida agrícola **SALIBRO®** no es fitotóxico a los cultivos agrícolas que se especifican en esta etiqueta, siempre y cuando se sigan todas las indicaciones referentes a dosificación, equipo de aplicación, época de aplicación y precisiones señaladas en la sección "Instrucciones de Uso" de esta etiqueta. No aplique a cultivos que no tengan una recomendación de uso en esta etiqueta. Cuando se desconozca la compatibilidad con cualquier mezcla o variedad de cultivos, se debe realizar una prueba antes de su aplicación, para saber si causan efectos fitotóxicos.

No aplique **SALIBRO®** después de un evento de precipitación abundante ya que el suelo se encontrará saturado e impedirá que el producto alcance el sistema radicular del cultivo.

No usar en sistemas hidropónicos.

No usar en bandejas de trasplantes.

No haga inmersión directa a raíces.

No remoje ni empape directamente las raíces desnudas ("sin sustrato") durante el proceso de plantación, p. Ej. Aplicaciones en el agua de trasplante.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA No se recomienda **SALIBRO®** en mezclas de tanque.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYP DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

MODO DE ACCIÓN:

Si bien es de mecanismo desconocido, ha sido ampliamente estudiado y parece ser diferente de todos los demás nematicidas disponibles en la actualidad, incluyendo los fumigantes tradicionales, organofosforados y carbamatos, así como ingredientes activos más nuevos como abamectina, fluopiram, fluensulfone y tiozafafen.

 **RED DE CUSTODIA** Protegiendo nuestro futuro. Conozca más de nuestro programa en: www.reddecustodia.com



Registro Sanitario: RSCO-NEMA-0915-X0020-064-41.15

Banda Precautoria: Verde

Categoría toxicológica: 5 Precaución

Titular del registro: CORTEVA MX, S.A. DE C.V.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la etiqueta.

Fecha de actualización: Febrero 2023