

# FICHA TÉCNICA

Categoría: Protección



## Fia Sistemic

SULFATO DE COBRE  
PENTAHIDRATADO QUELATADO

### DATOS GENERALES

|   |         |
|---|---------|
| Sulfato de Cobre Pentahidratado<br>Quelataado.                                  | 29.107% |
| Equivale a 382.5 g de Sulfato de Cobre<br>Pentahidratado Quelataado/L (a 21 °C) |         |
| Diluyente y espesante   | 70.893% |
|   | 100%    |

**Fia Sistemic** es un fungicida a base de Cobre. Se recomienda para aplicación foliar en los cultivos y para las enfermedades aquí indicadas.

### PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel y los ojos, lavarse con suficiente agua limpia, si el producto ha sido ingerido, no provocar el vómito ni administrar medicamentos hasta que sea revisado por el médico, quien deberá ver la etiqueta. Cámbiese inmediatamente la ropa contaminada.

### PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Este es un producto inocuo para humanos, fauna y medio ambiente en general. Sin embargo, se recomienda seguir las medidas de cuidado para el plaguicida con el que se mezcla. No contaminar el suelo ni depósitos y corrientes de agua. No reutilice este envase, devuélvalo al proveedor o envíelo a un centro de acopio de envases plaguicidas.

### TRANSPORTE

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas, ropa o forraje. Manténgase en su envase original bien cerrado y etiquetado. Almacene a temperatura ambiente (40°C máximo), en un lugar ventilado, sombreado y retirado del fuego o fuentes de calor.

### GARANTÍA

Se garantiza el contenido neto y la concentración expresada en la etiqueta, el fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de los daños causados por manejo inadecuado o como resultado de condiciones climáticas adversas.

### INSTRUCCIONES DE USO

| CULTIVO   | ENFERMEDAD                                  | DOSIS               | OBSERVACIONES   |
|---|---|---------------------|---|
| Jitomate<br>Chile<br>Chile Bell<br>Berenjena<br>Tomate de cáscara<br>Papa | Tizón tardío<br>(Phytophthora<br>infestans) | 1.0 - 2.0<br>(L-Ha) | Realizar dos<br>aplicaciones, al follaje a<br>intervalos de 8 días,<br>volumen de aplicación<br>200 a 400 litros de<br>agua/Ha. |

### RECOMENDACIONES DE USO

El intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha es: Sin límite.

Horas de reentrada al área tratada: 24 horas después de haber aplicado el producto. Por ser un producto de contacto y de bajo impacto ambiental, se considera un producto noble para la fauna, sin embargo, por ser un producto de contacto es conveniente resguardar abejorros (en caso de tener).

### FITOTOXICIDAD

Este producto no es Fitotóxico si se aplica en las dosis y de la manera aquí recomendadas.

### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y nutrientes foliares. Utilice siempre el equipo de protección recomendado.



Distribuido por:  
Fertilizantes e Insumos  
Agrícolas, S.A. de C.V.  
Av. Del Dren #7852 Sur,  
Col. Argentina II, Campo Diez,  
Culiacán, Sin., México. C.P. 80396.  
Teléfono: +52 (667) 717 1245