

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS				
TIPO DE AGROINSUMO: Fungicida agrícola				
NOMBRE COMERCIAL: CAPTAN ULTRA 50 WP				
FORMULACIÓN: Polvo Humectable		pH DE LA FORMULACIÓN: NC	COLOR: Blanco	SOLUBILIDAD EN AGUA: Dispersable
COMPOSICIÓN PORCENTUAL		% EN PESO	PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN:	
Ingrediente activo			Captan	
Captan			FAMILIA QUÍMICA:	
N-(triclorometilitio)ciclohex-4-en-1,2-dicarboximida		50.0	Carboximidás	
(Equivalente a 500 g de i.a./kg)			FORMULA QUÍMICA:	
Ingredientes inertes			C ₉ H ₈ Cl ₃ NO ₂ S	
Diluyente, humectante, dispersante y compuestos relacionados		50.0		
Total		100.0		
MODO DE ACCIÓN: CAPTAN ULTRA 50 WP es un Fungicida preventivo de amplio espectro, de aplicación foliar y al suelo. CAPTAN ULTRA 50 WP Resulta efectivo en el control preventivo de <i>Alternaria</i> , <i>Antracnosis</i> , <i>Fusarium</i> , mancha negra, manchas foliares, mildiu, moho gris, roñas y tizonés.				
CATEGORÍA DE PELIGRO: 4 PRECAUCIÓN		RESIDUALIDAD: Moderadamente	NÚMERO DE REGISTRO: RSCO-FUNG-0306-352-002-050	
USOS AUTORIZADOS:				
Cultivos	Enfermedades	Dosis kg/ha	Recomendaciones	
Berenjena (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum phomoides</i>)	2.0 a 3.0	Aplique a la emergencia o con los primeros síntomas. Repita cada 5 a 7 días.	
Calabacita (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>)	2.0 a 3.0	Aplique al primer síntoma. Repita cada 5 a 7 días.	
Césped (SL)	Secadera (<i>Fusarium spp</i>) Mancha de la hoja (<i>Piricularia griseae</i>)	250 g/100 L de agua	Aplique al primer síntoma. Repita cada 7 a 14 días.	
Chile (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum capsici</i>)	2.0 a 3.0	Aplique con intervalos de 4 a 7 días.	
Fresa (SL)	Peca de la hoja (<i>Mycosphaerella fragariae</i>)	3.0 a 4.0	Aplique al inicio de la brotación y antes de la formación de frutos. Repita semanalmente.	
Fresa, Arándano, Frambuesa, Grosella, Zarzamora (SL)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Jitomate (Tomate rojo) (SL)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>) Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum phomoides</i>)	1.5 a 3.0	Aplique al primer síntoma y repita cada 5 a 7 días.	
Mango (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>) Cenicilla (<i>Oidium mangiferae</i>)	250 a 350 g/100 L de agua	Aplique al primer síntoma. Repita semanalmente.	
Manzano (SL)	Roña (<i>Venturia inaequalis</i>)	200 a 250 g/100 L de agua	Haga 1 o 2 aplicaciones con las floraciones tardías y 1 o 2 en precosecha.	
Melón, pepino, sandía (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>) Tizón foliar (<i>Alternaria cucumerina</i>)	2.0 a 3.0	Aplique al primer síntoma y repita cada 5 a 7 días.	
Ornamentales (SL)	Mancha foliar (<i>Mycosphaerella spp</i>) Mancha negra (<i>Diplocarpon rosae</i>)	250 g/100 L de agua	Aplique al primer síntoma y repita cada 7 a 14 días.	
Peral (SL)	Roña (<i>Venturia pirina</i>)	250 g/100 L de agua	Haga 2 aplicaciones antes de la floración.	
Vid (SL)	Mildiu (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 a 250 g/100 L de agua	Haga 2 aplicaciones antes de la floración.	
Vid, Kiwi (SL)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	2.5 a 4.0	Realice 3 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad Volumen de aplicación sugerido: 350 a 450 litros de agua/ha.	
Zanahoria (SL)	Tizón foliar (<i>Cercospora carotae</i>) Tizón foliar (<i>Alternaria dauci</i>)	4.0	Aplique al primer síntoma y repita cada 5 a 7 días.	
(SL) Intervalo de seguridad Sin Límite.				
Nota: En los cultivos que se recomienda por concentración (g en 100 L de agua), moje perfectamente el cultivo de acuerdo con el equipo de aplicación y el tamaño del cultivo por proteger.				
Tiempo de reentrada: Se puede reingresar a las áreas tratadas 24 horas después de aplicación.				
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS: Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso.		PRESENTACIONES COMERCIALES: Bolsa de 1 Kg Bolsa de 25 Kg	RESPONSABLE DEL PRODUCTO: Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369 Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 01 844 438 05 00.	