Entido Max®

FUNGICIDA

FICHA TÉCNICA

Entido Max® es un fungicida con un nuevo modo de acción y es el primer miembro de una nueva familia de agroquímicos, Grupo 49 Inhibidor de la unión del **oxiesterol** con la proteína en las membranas citoplasmaticas, afecta la síntesis de lípidos afectando la integridad y permeabilidad de las membranas en los oomycetos.

CORTEVA™ agriscience

Visítanos en **www.corteva.mx**

™® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2025 Corteva

Entido Max®

FUNGICIDA

AHORA TODO TIENE SENTIDO
MAX rápido y efectivo.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.
Ingrediente Activo: Oxatiapiprolin +Dimetomorf
Familia Química: Oxatiapiprolin (Oxazol, Pirazol y Tiazol) y Dimetomorf (derivados del ácido cinámico-morfolinas).
Presentaciones: 1L
Categoría Toxicológica: 5 (Banda verde)
Registro Sanitario: RSCO-MEZC-FUNG-303X-0301D-X0103-425-29.7

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Ingrediente Activo: Oxatiapiprolin Equivalente a 15 g de i.a./L +Dimetomorf Equivalente a 300 g de i.a/L
Ingredientes Inertes: Dispersante, adyuvante, emulsificantes, estabilizador, espesante, agente humectante, anticongelante, antiespumante, agente de suspensión, conservador y diluyente.

MODO DE ACCIÓN
Inhibe la germnación de esporangios y zoospora, el crecimiento del micelio dentro de las hojas y bloquea la esporulación del hongo lo que impide su dispersión

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL/ha)	RECOMENDACIONES	LMR (ppm)*	
				Oxatiapiprolin	Dimetomorf
Tomate rojo (4)	Tizón Tardío *(Phytophthora infestans)*	1100-1300	Foliar: Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación: 500 – 600 L de agua/ha.	0.5	1.5
Papa (14)	Tizón Tardío *(Phytophthora infestans)*	800-1000	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad y/o se presenten los primeros síntomas, sin que sobrepase el 3% de infección. Volumen de aplicación sugerido 450-550 L de agua/ha.	0.07	0.15
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (1)	Mildiú *(Pseudoperonospora cubensis)*	800-1000	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar de manera preventiva cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad y/o se presenten los primeros síntomas, sin que sobrepasen el 3% de infección. Volumen de aplicación sugerido 550-650 L de agua/ha.	0.2	0.5

( ) Intervalo de Seguridad = Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de re-entrada a las zonas tratadas: No entre o permita que otras personas entren en el área aplicada sin el adecuado equipo de protección en un lapso de 12 horas después de la aplicación. Consulte la sección "Equipo de Protección" de esta etiqueta.

™® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2025 Corteva

CONTRAINDICACIONES: No se aplique cuando el cultivo esté en condiciones adversas (estrés) tales como: sequía, inundación, temperaturas bajas extremas, ataques de insectos, deficiencias nutricionales o cualquier otro factor que interfiera con el crecimiento del cultivo.

• **Entido Max®** penetra rápidamente los tejidos de las plantas tratadas, por lo cual, es resistente al lavado 20 minutos después de su aplicación, debido esto, no se aplique cuando se observen condiciones de presencia inminente de lluvia o después de un evento de esta naturaleza ya que se corre el riesgo que el producto sea lavado y la eficacia del producto disminuya, permita que el follaje se seque para continuar con la aspersión.
• **Entido Max®** no es fitotóxico a los cultivos mencionados ni a las dosis aquí recomendadas, siempre y cuando se sigan las instrucciones incluidas en el cuadro de recomendaciones de esta etiqueta.
• **Entido Max®** no está recomendado para su aplicación en sistemas de riego.

FITOTOXICIDAD: **Entido Max®** no está recomendado para mezclas en tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

• **Entido Max®** contiene el ingrediente activo Oxathiapiprolin (GRUPO FRAC 49) y Dimetomorf (GRUPO FRAC 40).

• No se recomienda usar únicamente **Entido Max®** u otros fungicidas de los GRUPOS 49 y 40 para controlar la misma enfermedad durante toda la temporada.

• Se recomienda rotar y/o mezclar con productos que tengan diferentes MoA o limitar el número total de aplicaciones por temporada.

• Para asegurar el correcto desempeño de **Entido Max®** es de estricto cumplimiento seguir las recomendaciones de uso de la etiqueta, principalmente lo que respecta a la dosis, el número de aplicaciones, intervalos, rotación y estado fenológico de los cultivos.

• No modifique la dosis recomendada en etiqueta, ni lo use fuera del momento recomendado.

• Se alienta el manejo responsable de la resistencia para garantizar un control efectivo a largo plazo de las enfermedades fúngicas. **Entido Max®** no debe alternarse o ser mezclado con cualquier fungicida al que ya se haya desarrollado resistencia.

GRUPOS	49 | 40	FUNGICIDA

RED DE CUSTODIA
PROTEGIENDO NUESTRO FUTURO
Conozca más de nuestro programa en: www.reddecustodia.com

YO ME COMPROMETO CON EL EPP COMPLETO · LEO Y SIGO LA ETIQUETA PARA LLEGAR A LA META · YO COMPRO LEGAL Y QUE FUNCIONE IDEAL · YO CUIDO EL AMBIENTE PARA SER COEXISTENTES · ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE · campo limpio · SINTOX 800.009.2800

Registro Sanitario:
RSCO-MEZC-FUNG-303X-0301D-X0103-425-29.7
Banda Precautoria: Verde
Categoría toxicológica: 5
Titular del registro: CORTEVA MX, S.A. DE C.V.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la etiqueta.

Fecha de actualización: Junio 2025

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2025 Corteva